

Amorim A.^{*†} DDS, Amorim T.[†] DDS, Lavado J.^{**} TPD, Amoroso J.^{**} TPD, Tocantins E.^{**} DDS
^{*} Autor [†]Instituto Superior de Ciências da Saúde - Egas Moniz ^{**} Faculdade de Medicina Dentária Universidade de Lisboa

REABILITAÇÃO BIMAXILAR IMPLANTO-SUPORTADA

NUM PACIENTE DESDENTADO TOTAL: CASO CLÍNICO

PALAVRAS CHAVE: reabilitação oral, implantes, desdentado, carga imediata,

DESCRIÇÃO DO CASO: Paciente do sexo masculino, saudável, com 78 anos, surgiu na clínica descontente com as suas próteses, devido à falta de retenção das mesmas, consequente à reabsorção óssea a nível dos maxilares. Tinha como principal objetivo melhorar a sua função mastigatória e restabelecer a estética do seu sorriso. Após ter sido efetuada uma completa história clínica e radiográfica, verificaram-se todos os parâmetros necessários à realização de uma reabilitação total bimaxilar sobre implantes. Foram colocados seis implantes no maxilar superior e quatro implantes no maxilar inferior (todos Branemark System MkIV 4X15mm). No maxilar superior foi efetuada carga imediata apenas em 4 implantes, sobrando dois implantes que foram utilizados na prótese definitiva após o período de osteointegração.



Fig. 1 - Fotografias iniciais: a) Ortopantomografia inicial b) intra-oral sem próteses c) Ortopantomografia da carga imediata

DISCUSSÃO: A perda dos dentes promove reabsorção óssea ao nível dos maxilares, comprometendo a reabilitação dos mesmos. Este protocolo cirúrgico permite a colocação de implantes e respetiva carga imediata. Devido ao facto de ser uma técnica cirúrgica e protética simples, e por apresentar uma elevada taxa de sucesso, a reabilitação total sobre implantes e respetiva carga imediata é utilizada cada vez mais em casos de pacientes desdentados totais.



Fig. 2 - Próteses provisórias no dia da remoção de pontos **Fig. 3 -** Impressão definitiva **Fig. 4 -** Prova de dentes em cera



Fig. 5 - Prova de cerâmica **Fig. 6 -** Prova de cerâmica sorriso **Fig. 7 -** Prova de cerâmica foto de perfil

CONCLUSÃO: A reabilitação oral sobre implantes com carga imediata, demonstrou ser eficaz em termos cirúrgicos, protéticos e biomecânicos, devolvendo ao paciente o conforto, estética e função mastigatória.



Fig. 8 - Ortopantomografia próteses definitivas **Fig. 9 -** Sorriso final **Fig. 10-** Fotografia intra-oral final



Fig. 11- Prótese definitiva superior **Fig. 12-** Fotografia oclusal superior final **Fig. 13-** Fotografia oclusal inferior final **Fig. 14-** Prótese definitiva inferior

Fig. 15- Close up final